

**ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ**  
**Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ**  
**ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ**  
**10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019**

**ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

**ΘΕΜΑ Α**

**A1. α.** Ορισμός, σελίδα σχολικού βιβλίου 15.

**β. i.** Η συνάρτηση έχει αντίστροφη όταν είναι 1-1 στο  $A$ .

**ii.** Είναι η συνάρτηση  $g: f(A) \rightarrow \mathbb{R}$  με την οποία για κάθε  $y \in f(A)$  αντιστοιχίζεται μοναδικό  $x \in A$  για το οποίο ισχύει  $f(x) = y$ . Η συνάρτηση αυτή  $g$  συμβολίζεται  $f^{-1}$ .

**A2.** Θεώρημα Fermat, σελίδα σχολ. βιβλίου 142.

**A3.** Θεώρημα, σελίδα σχολ. βιβλίου 135.

**A4. α.** Λάθος

Έστω η συνάρτηση  $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$

Παρατηρούμε ότι, αν και  $f'(x) = 0$ , για κάθε  $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ , εντούτοις η  $f$  δεν είναι σταθερή στο  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ .

**A4. β)** Λάθος. Έστω η  $f(x) = \begin{cases} x-2, & x > 3 \\ 5, & x = 3 \end{cases}$

Είναι  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x-2) = 1 \neq f(3)$

**A5. γ.**

## ΘΕΜΑ Β

**B1.** Ισχύει ότι  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + \lambda) = 2 \Leftrightarrow \lambda = 2$ .

**B2.** Έστω συνάρτηση  $g$  με  $g(x) = f(x) - x = e^{-x} - x + 2$ ,  $x \in [2, 3]$ .

Η συνάρτηση  $g$  είναι συνεχής στο  $[2, 3]$ , ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων.

$$\left. \begin{aligned} g(2) &= e^{-2} - 2 + 2 = e^{-2} > 0 \\ g(3) &= e^{-3} - 3 + 2 = \frac{1}{e^3} - 1 = \frac{1 - e^3}{e^3} < 0 \end{aligned} \right\} g(2) \cdot g(3) < 0.$$

Από το θεώρημα Bolzano υπάρχει τουλάχιστον ένα  $x_0 \in (2, 3)$  τέτοιο ώστε  $g(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = x_0$ .

Επίσης  $g'(x) = -e^{-x} - 1 < 0$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .

Άρα η  $g$  είναι γνησίως φθίνουσα, συνεπώς είναι 1-1 στο  $\mathbb{R}$ , οπότε η  $x_0$  είναι μοναδική λύση στο  $\mathbb{R}$ .

**B3.**  $f'(x) = -e^{-x} < 0$ . Άρα η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα στο  $\mathbb{R}$ , οπότε είναι 1-1, άρα αντιστρέφεται.


$$y = f(x) \Leftrightarrow y = e^{-x} + 2 \Leftrightarrow y - 2 = e^{-x} \Leftrightarrow \ln(y - 2) = -x \Leftrightarrow x = -\ln(y - 2)$$

$$\text{Άρα } f^{-1}(x) = -\ln(x - 2), \quad x > 2.$$

**B4.** Είναι  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f^{-1}(x) = -\infty$ , αφού εάν θέσουμε  $x - 2 = u$  όταν  $x \rightarrow 2^+ \Rightarrow u \rightarrow 0^+$ .

$$\text{Άρα } \lim_{x \rightarrow 2^+} f^{-1}(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} [-\ln(x - 2)] = -\lim_{x \rightarrow 2^+} \ln(x - 2) = -\lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = +\infty \quad \text{διότι}$$
$$\lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty.$$

Άρα η  $x = 2$  είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης  $C_f$ .



### ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η  $f(x)$  είναι συνεχής στο  $x_0 = 1$  ως παραγωγίσιμη.

$$\text{Οπότε } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \Leftrightarrow 1 + \beta = 1 + \alpha \Leftrightarrow \alpha = \beta$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{x-1} + \beta x - 1 - a}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{x-1} + \beta x - 1 - \beta}{x - 1} \stackrel{\left(\frac{0}{0}\right)}{=} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{x-1} + \beta}{1} = \beta + 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + a - 1 - a}{x - 1} = - \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1) \cdot (x+1)}{x-1} = -2$$

Επειδή η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο 1, πρέπει  $\beta + 1 = 2$ , άρα  $\beta = 1$ , οπότε και  $\alpha = 1$ .

Γ2. Για  $x > 1$ ,  $f'(x) = 2x > 0$  (1)

για  $x < 1$ ,  $f'(x) = e^{x-1} + 1 > 0$  (2)

και  $f$  συνεχής στο 1. (3)

Από (1), (2) και (3) συμπεραίνουμε ότι η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $\mathbb{R}$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 1) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{x-1} + x) = -\infty$$

Άρα  $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ .

Γ3. i.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ . Άρα υπάρχει  $\kappa < 0$  τέτοιο ώστε  $f(\kappa) < 0$  (1).

$$f(0) = e^{-1} = \frac{1}{e} > 0 \quad (2).$$

Άρα από Θεώρημα Βολζανο στο  $[\kappa, 0]$ , υπάρχει  $x_0 \in (\kappa, 0)$  ώστε  $f(x_0) = 0$ . Η  $x_0$  είναι μοναδική λόγω μονοτονίας της  $f$ .

ii.  $f^2(x) - x_0 f(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) \cdot (f(x) - x_0) = 0$  (1)

Ισχύει  $f(x) \neq 0$  για κάθε  $x > x_0$ , άρα η (1) στο  $(x_0, +\infty)$  είναι ισοδύναμη με την

$$f(x) - x_0 = 0 \Leftrightarrow f(x) = x_0.$$

Η τελευταία είναι αδύνατη στο  $(x_0, +\infty)$  διότι  $f$  γνησίως αύξουσα, άρα


$$f(x) > f(x_0) \Leftrightarrow f(x) > 0 \quad \text{ενώ } x_0 < 0.$$

Γ4.  $M(x(t), y(t)) \Rightarrow y(t) = x^2(t) + 1$

$x(t_0) = 3$

$y(t_0) = 10$

$x'(t_0) = 2$



$E(t) = \frac{1}{2}x(t)y(t) \Rightarrow$

$E'(t) = \frac{1}{2}x'(t)y(t) + \frac{1}{2}x(t)y'(t) \Rightarrow$

$E'(t_0) = \frac{1}{2}x'(t_0)y(t_0) + \frac{1}{2}x(t_0)y'(t_0).$

Ισχύει:  $y'(t_0) = 2x(t_0)x'(t_0) = 2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$

Άρα  $E'(t_0) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 12 = 28 \text{ } \mu\text{s}.$

### ΘΕΜΑ Δ

**Δ1.**  $f(x) = (x-1) \cdot \ln(x^2 - 2x + 2) + \alpha x + \beta$

$\varepsilon: y = -x + 2$

$f(1) = 1 \Leftrightarrow \alpha + \beta = 1$

$f'(1) = -1$

$f'(x) = \ln(x^2 - 2x + 2) + (x-1) \frac{2x-2}{x^2 - 2x + 2} + \alpha$

$f'(1) = -1 \Leftrightarrow \boxed{\alpha = -1}$  και  $\boxed{\beta = 2}$

**Δ2**  $f(x) = (x-1) \cdot \ln(x^2 - 2x + 2) - x + 2$  Η  $f$  συνεχής στο  $\mathbb{R}$  άρα και στο  $[1, 2]$

$E = \int_1^2 |(x-1) \ln(x^2 - 2x + 2) - x + 2| dx =$   
 $= \int_1^2 |(x-1) \ln(x^2 - 2x + 2)| dx$

όπου  $(x-1) \cdot \ln(x^2 - 2x + 2) \geq 0$  για κάθε  $x \in [1, 2]$

Έστω  $u = x^2 - 2x + 2 \Leftrightarrow du = (2x - 2) dx \Leftrightarrow$

$du = 2(x-1) dx \Leftrightarrow \frac{1}{2} du = (x-1) dx$

Για  $x = 1 \Rightarrow u_1 = 1$

Για  $x = 2 \Rightarrow u_2 = 2$

$E = \frac{1}{2} \int_1^2 \ln u du = \frac{1}{2} [u \ln u]_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 1 \cdot du =$   
 $= \frac{1}{2} (2 \ln 2) - \frac{1}{2} \cdot 1 = \ln 2 - \frac{1}{2}$  τ.μ.

**Δ3. i.** Είναι  $f'(x) = \ln[(x-1)^2 + 1] + \frac{2(x-1)^2}{(x-1)^2 + 1} - 1, x \in \mathbb{R}$

Προφανώς για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ , θα ισχύει

$\ln[(x-1)^2 + 1] + \frac{2(x-1)^2}{(x-1)^2 + 1} \geq 0$ . Η ισότητα ισχύει μόνο για  $x = 1$ , επομένως  
 $f'(x) \geq -1, \forall x \in \mathbb{R}$ .

**ii.** Είναι για  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $f\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) + \lambda \geq (\lambda - 1) \ln(\lambda^2 - 2\lambda + 2) + \frac{3}{2} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow f\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) \geq (\lambda - 1) \ln(\lambda^2 - 2\lambda + 2) - \lambda + 2 - \frac{1}{2} \Leftrightarrow$

$\Rightarrow f\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) \geq f(\lambda) - \frac{1}{2} \quad (1)$

Θεωρώντας τη συνάρτηση  $f$  στο διάστημα  $\left[\lambda, \lambda + \frac{1}{2}\right]$  ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, επομένως υπάρχει ένα τουλάχιστον  $\xi \in \left(\lambda, \lambda + \frac{1}{2}\right)$  τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) - f(\lambda)}{\frac{1}{2}}. \text{ Όμως από } \Delta 3 \text{ (i),}$$

$$f'(\xi) \geq -1. \text{ Άρα } \frac{f\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) - f(\lambda)}{\frac{1}{2}} \geq -1 \Leftrightarrow f\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) - f(\lambda) \geq -\frac{1}{2} \text{ δηλαδή η}$$

(1).

**Δ4.** Η  $g$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  με  $g'(x) = -3x^2 - 1$ .

Είναι:

- $f'(x_1) \geq -1$ ,  $x_1 \in \mathbb{R}$  και η ισότητα ισχύει για  $x_1 = 1$  (από **Δ3.i.**)
- $g'(x_2) \leq -1$ ,  $x_2 \in \mathbb{R}$  και η ισότητα ισχύει για  $x_2 = 0$

Οπότε  $f'(x_1) > g'(x_2)$  για κάθε ζεύγος  $(x_1, x_2)$  με  $(x_1, x_2) \neq (1, 0)$

Η εφαπτομένη της  $C_f$  στο  $A$  είναι  $y = -x + 2$  και η εφαπτομένη της  $C_g$  στο σημείο  $B(0, 2)$  είναι  $y - 2 = -1(x - 0) \Leftrightarrow y = -x + 2$ .

Άρα η  $\varepsilon$  μοναδική κοινή εφαπτομένη των  $C_f, C_g$  στα σημεία τους  $A, B$  αντίστοιχα.